


# ПИКАССО.

Среднеспелый (85-95 дней или 5 из 9) сорт столового назначения с жёлтой кожурой, светло-жёлтой мякотью и розовыми глазками.

**С**  
Столовый

- Высокая урожайность
- Устойчив к засухе
- Оригинальный внешний вид



## Общее описание

**Производитель: Duoplant V.O.F., Luttelgeest**

**Скращено: Cara x Ausonia**

сорт столового назначения с жёлтой кожурой, светло-жёлтой мякотью и розовыми глазками, среднее количество клубней – 10 шт. Кулинарный тип - разваристый, содержание сухих веществ – 20,8.

Формирует крупные, выровненные, овальные клубни с поверхностными глазками и привлекательным внешним видом.

Подходит для выращивания на всех типах почв, хорошо переносит засуху во время вегетации.

Развитие растения на протяжении всего периода вегетации хорошее; плотная ботва хорошо закрывает почву.

## Устойчивость к болезням (9 – максимум, 1 – минимум)

вирус Yn	среднеустойчив (7)
вирус X	устойчив (9)
фитофтороз ботвы	слабоустойчив (5)
фитофтороз клубней	среднеустойчив (7)
фузариоз	среднеустойчив (7)
парша обыкновенная	среднеустойчив (7)
золотистая нематода (Ro 1,4)	устойчив (9)
рак картофеля (1)	иммунен



[www.agrico-cis.ru/catalog/sorta/Picasso/](http://www.agrico-cis.ru/catalog/sorta/Picasso/)

### ПРОРАЩИВАНИЕ/ПРОГРЕВ

Может высаживаться прямо из хранилища; для ускорения появления всходов и развития растений рекомендуется предварительное проращивание или температурный шок.

### ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ ПРИ ПОСАДКЕ

на столовые цели (междурядье 75 см)  
фракция 35/55 – около 30 см (44 000 клубней /Га)

на семенные цели (междурядье 75 см)  
фракция 35/55 – около 22 см (60 000 клубней /Га)

### УДОБРЕНИЯ:

азот – стандартная доза + 5%  
фосфор – стандартная доза  
калий – стандартная доза

### ОСОБЕННОСТИ ХИМ.ЗАЩИТЫ

#### ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРИ ПОСАДКЕ

Профилактика бактериозов: во время протравливания при посадке или при протравливании в складе добавить к имеющемуся протравителю (или баковой смеси протравителей) контактный фунгицид действующего вещества Тирам (400 г/л) из расчета от 4 до 6 л/га.

#### МЕТРИБУЗИН

устойчивость к метрибузину достаточно высокая (7 из 9), его применение иногда ведёт к обесцвечиванию ботвы, но без снижения урожайности.

#### ФИТОФТОРОЗ/АЛЬТЕРНАРИОЗ

рекомендуется использовать профилактическую систему защиты от фитофтороза и альтернариоза



Say potato,  
say **Agrico.**

### УБОРКА

**Очень устойчив к потемнению мякоти от ударов и чёрной пятнистости. Для формирования кожуры после десикации необходимо минимум две недели.**

Для формирования кожуры может быть рекомендовано осуществить обработку ботвы ( в конце вегетации, но по зеленой массе) смесью монокалийфосфата и аммиачной селитры ( на 300 л воды 30 кг монокалийфосфата и 1,5 кг селитры, расход рабочей жидкости на 1 га 300 л). Это ускорит отток сухих веществ из ботвы в клубни и обеспечит формирование кожуры.

во избежание развития водянистой раневой гнили (питуума), фузариоза, мягких гнилей не рекомендуется проводить уборку при температуре мякоти клубня свыше 21 градуса; риск возникновения упомянутых выше болезней также возрастает при уборке в сухих условиях на тяжелых почвах с большим содержанием почвенных комков.

### ХРАНЕНИЕ

Характеризуется продолжительным периодом покоя и хорошо подходит для длительного хранения (до 8 месяцев) при температуре +4,0 градусов.