

ЭКСЕЛЕНС.

Среднеранний (6,5 из 9 или 75-85 дней) сорт для чистки, упаковки, реализации в свежем виде и производства картофеля фри в домашних условиях.



- Для упаковки и мойки
- Подходит для жарки
- Высокая товарность клубней



Общее описание

Производитель: Agrico Research, Bant

Скращено: Lady Olympia x Red One

Кожура клубней – желтая, мякоть светло-жёлтая, глазки поверхностные. Форма клубней удлинённо-овальная; количество – выше среднего, выровненной формы и высокой товарности, крупного размера с поверхностными глазками. Содержание сухих веществ – 21; подводный вес – 390, характеризуется сравнительно низким содержанием сахаров, кулинарный тип – разваристый (BC). Может возделываться на большинстве типов почв, подходит для упаковки благодаря привлекательному цвету и качеству кожуры.

Устойчивость к болезням (9 – максимум, 1 – минимум)

вирус Yn	среднеустойчив (7)
вирус X и Yntn	устойчив (8)
фитофтороз ботвы	слабоустойчив (5)
фитофтороз клубней	слабоустойчив (5)
фузариоз	слабоустойчив (5)
парша обыкновенная	средне устойчив (6)
золотистая нематода (Ro 1,4)	устойчив (9)
рак картофеля (1)	иммунен



ПРОРАЩИВАНИЕ/ПРОГРЕВ

Рекомендуется подвергнуть клубни предварительному проращиванию после обламывания апикальных ростков; в иных случаях предварительное проращивание не обязательно, достаточно подвергнуть клубни температурному шоку перед посадкой; обламывание боковых ростков более одного раза может стать причиной снижения урожайности.

Не высаживать в холодную почву (менее 10 градусов).

ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ ПРИ ПОСАДКЕ

на столовые цели (междурядье 75 см)
для фракции семенного картофеля 30/55 – 3,75 кл./м
или 27 см (50 000 шт./га) с целью получения товарной фракции 55/70

дистанция между клубнями при посадке на семенные цели (междурядье 75 см)

Для фракции семенного картофеля 30/55 – 4,5 – 5 кл./м
или 20-22 см (60 000 – 66 000 шт./га) с целью товарной фракции 30/55.

УДОБРЕНИЯ:

Азот на 10% БОЛЕЕ принятого стандарта; если вносимая доза до 150 кг по д.в. рекомендуется единовременное внесение при посадке
Фосфор – стандартные требования.
Калий – стандартные требования.

www.agrico-cis.ru/catalog/sorta/Excellency/

ОСОБЕННОСТИ ХИМ.ЗАЩИТЫ

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРИ ПОСАДКЕ

Профилактика бактериозов: во время протравливания при посадке или при протравливании в складе добавить к имеющемуся протравителю (или баковой смеси протравителей) контактный фунгицид действующего вещества Тирам (400 г/л) из расчета от 4 до 6 л/га.

МЕТРИБУЗИН

устойчивость к метрибузину НИЗКАЯ (4 из 9), его применение (особенно по всходам) ведёт к обесцвечиванию ботвы и заметному снижению урожайности.

ФИТОФТОРОЗ/АЛЬТЕРНАРИОЗ

рекомендуется использовать профилактическую систему защиты от фитофтороза и альтернариоза)



Say potato,
say **Agrico.**

УБОРКА

Для формирования кожуры, достаточной для осуществления механической уборки, после десикации (кошения) ботвы может потребоваться около 3-х недель.

Для формирования кожуры может быть рекомендовано осуществить обработку ботвы (в конце вегетации, но по зеленой массе) смесью монокалийфосфата и аммиачной селитры (на 300 л воды 30 кг монокалийфосфата и 1,5 кг селитры, расход рабочей жидкости на 1 га 300 л). Это ускорит отток сухих веществ из ботвы в клубни и обеспечит формирование кожуры.

Во избежание развития водянистой раневой гнили (питуума), фузариоза, мягких гнилей не рекомендуется проводить уборку при температуре мякоти клубня свыше 21 градуса; риск возникновения упомянутых выше болезней также возрастает при уборке в сухих условиях на тяжелых почвах с большим содержанием почвенных комков.

ХРАНЕНИЕ:

средний период покоя (6,5 месяцев при температуре +4 +5 градусов).